

Test wstępny

Opublikowane na Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
(<https://endokrynologia.wum.edu.pl>)

Test wstępny [1]

Przykładowe pytania do testu wstępnego:

1. W typowym obrazie moczówki prostej występują:
2. Fizjologiczna, metaboliczna rola hormonu wzrostu – GH polega m.in. na:
3. Zespół SIADH charakteryzuje się:
4. Hiponatremia może wystąpić w przebiegu następujących endokrynopatii:
5. Wskaż jednostkę chorobową, która nie należy do zespołu APS 2
6. Do hormonów posiadających wspólną jednostkę λ należą poniższe za wyjątkiem
7. Przyczyną hipogonadyzmu hipogonadotropowego nie jest
8. Przyczyną przedwczesnego wygaśnięcia funkcji jajnika może być
9. Przygodne jednorazowe oznaczenie kortyzolu. Wskaż prawidłową odpowiedź
10. Nadrzędnym ośrodkiem odpowiadającym za regulację hormonalną jest
11. Badaniami oceniającymi funkcję nadnerczy są
12. Akromegalia zwiększa ryzyko rozwoju
13. Do objawów akromegalii nie należy
14. Najczęstszym hormonalnie czynnym guzem przysadki jest
15. Hormonem 2 giej fazy cyklu miesięcznego u kobiety jest
16. Estrogeny powodują wskaż odpowiedź fałszywą
17. Progesteron
18. Hormonem przedniego płata przysadki nie jest
19. Wydzielanie TSH jest regulowane przez
20. Prolaktyna. Wskaż odpowiedź fałszywą
21. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące hormonu wzrostu
22. Wydzielanie ACTH zwiększa
23. Wazopresyna jest syntetyzowana
24. Wazopresyna. Wskaż twierdzenie fałszywe
25. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą hormonów tarczycy
26. Wskaż odpowiedź fałszywa dotyczącą receptora dla TSH

Test wstępny

Opublikowane na Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
(<https://endokrynologia.wum.edu.pl>)

27. Najczęstszym nowotworem tarczycy występującym na terenach prawidłowego zaopatrzenia w jod jest
28. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą tyreoglobuliny
29. Do syntezy hormonów tarczycy są potrzebne
30. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą TPO
31. Hormony tarczycy wiążą się z białkami osocza. Wskaż zdanie fałszywe
32. Na wynik oznaczenie TSH ma wpływ
33. Wolem nazywamy
34. Objawem niedoczynności tarczycy nie jest
35. Receptor dla hormonów tarczycy jest
36. Dla której choroby charakterystyczny jest szmer naczyniowy słyszalny nad tarczycą
37. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą TSH
38. Wskaż odpowiedź fałszywa dotyczącą wytrzeszczu
39. Podstawowe działanie metamizolu to
40. Przeciwciała przeciw TPO są dobrym wskaźnikiem choroby autoimmunizacyjnej tarczycy i i ich oznaczenie jest zasadne w następujących sytuacjach. Wskaż odpowiedź błędną
41. W przypadku podejrzenia niedoczynności tarczycy w pierwszej kolejności należy oznaczyć
42. Akropachia to
43. Jod-wskaż odpowiedź fałszywą
44. Przez jaką warstwę kory nadnerczy wydzielany jest kortyzol:
45. W pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy stwierdza się:
46. Wśród autoimmunologicznych chorób tarczycy można wymienić następujące:
47. Nadczynność tarczycy może wystąpić w następujących przypadkach poza
48. Krzywica, to choroba polegająca na deformacji kości spowodowanej:
49. W nadczynności przytarczyc stężenia wapnia i fosforanów we krwi i moczu przebiegają najczęściej w konstelacji:

Test wstępny

Opublikowane na Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
(<https://endokrynologia.wum.edu.pl>)

Adres źródła: <https://endokrynologia.wum.edu.pl/node/126>

Odnosiniki

[1] <https://endokrynologia.wum.edu.pl/node/126>